

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-9-64 339200

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

10 Septembre 1964

Bulletin n° 48 du mois de Septembre 1964

L'ANTHONOME DU POIRIER

Si cet ennemi du poirier est trop souvent considéré comme un parasite secondaire dans nos vergers, il cause cependant, d'appréciables dégâts dans certaines régions. Cet automne, l'Anthonome du poirier risque de se manifester avec une certaine intensité.

L'insecte parfait est un petit charançon qui se distingue de l'Anthonome du pommier, auquel il ressemble, par un corps plus trapu et une coloration plus vive. Ses téguments brun mat sont recouverts d'une pubescence blanche.

Bien qu'apparaissant en Mai, les adultes estivent sous divers abris et ne prennent leur activité que vers la mi-Septembre. Après accouplement, la femelle perfore, à l'aide de son rostre, l'écaille des bourgeons à fleurs et creuse au voisinage de l'inflorescence, une loge dans laquelle elle dépose un oeuf blanchâtre. L'orifice de ponte est ensuite obturé par un petit opercule de teinte différente de celle du bourgeon. La larve qui en éclôt dévore les ébauches de l'inflorescence. Les bourgeons attaqués ne débourent pas ou bien, s'ils subissent un commencement de développement, sèchent avant la floraison.

LUTTE

Une pulvérisation copieuse appliquée juste avant le début des pontes, permet d'obtenir de très bons résultats. Ce traitement devra être effectué dans la période du 18 au 25 Septembre (selon les situations) dans les vergers où ce parasite aura été observé. Utiliser le D.D.T. ou le Lindane, en rappelant que ces produits ne doivent pas être employés pendant les 15 jours qui précèdent la récolte.

.../...

204

Information

GRANDE CULTURE

BETTERAVES INDUSTRIELLES

CERCOSPORIOSE

Les premiers foyers de Cercosporiose de la betterave sont observés depuis quelques jours. Cette maladie progresse rapidement dans les secteurs habituellement contaminés à la suite du régime perturbé qui s'est installé sur nos régions.

Il est conseillé d'appliquer une couverture fongicide par pulvérisation (600 à 800 litres à l'hectare) dès réception du présent bulletin.

L'un des produits suivants pourra être utilisé :

- Oxychlorure de cuivre.
- Sulfate basique de cuivre.
- Oxyde cuivreux.
- Cupro - organique (Cuivre + Zinèbe).
- Manèbe.

Ne pas traiter les variétés résistantes à la Cercosporiose.

Les Contrôleurs :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur :
J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/Directeur-Gérant : L. BOUYX.